

Follow up per timoma e carcinoma timico

Dopo un trattamento curativo, il paziente viene giudicato guarito. Tuttavia come tutte le neoplasie maligne, anche i timomi e i carcinomi timici possono ripresentarsi in termini di recidiva locale, ovvero ripresentarsi nella zona da dove è originato e sottoposta a chirurgia e/o radioterapia o ripresentarsi con metastasi a distanza.

Il paziente dovrà pertanto iniziare un programma di controlli negli anni successivi al trattamento per escludere una recidiva di malattia e monitorare e correggere eventuali effetti collaterali del trattamento. Il **programma di follow-up** prevede:

- TC torace dopo circa 3-4 mesi dall' intervento chirurgico, indipendentemente dallo stadio e dalla neoplasia timica asportata.
- TC torace annuale per i primi 5 anni e successivamente ogni 2 anni per i pazienti affetti da timoma in stadio I-II radicalmente operati (può essere valutata un'intensificazione nei primi 2 anni con TC semestrale).
- TC semestrale per i primi due anni e poi annuale per i pazienti affetti da timoma in stadio III-IV, in tutti i pazienti con carcinoma timico, in tutti i casi di chirurgia non radicale. In alcuni casi a giudizio del medico i controlli possono essere intensificati.

Il **follow-up** dovrebbe durare dai **10 ai 15 anni** a seconda del giudizio del medico

[dkpdf-button]

[Contattaci](#)

[Dona ora](#)

[Associati](#)